



Debreceni Egyetem TTK – Atommagkutató Intézet
KÖRNYEZETFIZIKAI KIHELYEZETT TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Csige István

Debrecen, Poroszlay u. 6.

Levél cím: 4001 Debrecen, Pf. 51, tel.: (52)-509-200, fax: (52)-416-181,

e-mail.: csige@atomki.hu



Szakkolgozati, diplomamunka- és TDK-témák

a DE-Atomki Környezetfizikai Kihelyezett Tanszéken és az MTA Atommagkutató Intézetében a 2022/2023-es tanév 1. félévére

Környezetfizikai Tanszék

<i>Témavezető neve</i>	<i>Téma címe</i>
Dr. Papp Zoltán	1. Radon szabad téri dinamikájának kísérleti vizsgálata (fiz. BSc, MSc, fiz. tanár, TDK) 2. Radonbomlástermék-mérő módszer mérő-kiértékelő részének modernizálása (fiz. BSc, MSc)

MTA Atommagkutató Intézete

<i>Témavezető neve</i>	<i>Téma címe</i>
Dr. Csedreki László	Proton-indukált reakciók vizsgálata és felhasználása neutron-detektorok hatásfokának meghatározásában (fiz. BSc, fiz./fiz. tanár MSc, TDK)
Dr. Csedreki László – Dr. Kiss Árpád	Proton-indukált magreakciók vizsgálata magnézium céltárgyakon, témavezető (fiz. BSc, fiz./fiz. tanár MSc, TDK)
Dr. Cseh József – Dr. Darai Judit	1. Atommagok deformációja és fűtődése 2. A héj- és molekulaszervezet koegzisztenciája atommagokban 3. A soknukleon-rendszer szimmetriái
Dr. Csige István	A szén-dioxid és a radon gázok áramlása a talajban (fiz. BSc, fiz./környezetmérnök/geológus MSc)
Dr. Dombrádi Zsolt – Dr. Sohler Dorottya	Stabilitási sávtól távoli atommagok szerkezetének vizsgálata radioaktív nyalábokkal (fiz. tanár, fiz. BSc, MSc, TDK)
Dr. Elekes Zoltán	1. Ritka elemek keletkezésének vizsgálata atommag-reakciók segítségével (fiz. BSc, MSc, tanár, TDK) 2. Egzotikus atommagok szerkezetének vizsgálata és szerepük az elemek keletkezésében (fiz. BSc, MSc, tanár, TDK)
Dr. Juhász Zoltán – Dr. Sulik Béla	Világúr a laboratóriumban - ionokkal bombázott molekulák szétesése (fiz. BSc, MSc, TDK)
Dr. Juhász Zoltán – Herczku Péter	Világúr a laboratóriumban - szerves molekulák szintézise ionokkal bombázott nagyon hideg (10-20 K) víz-, széndioxid-, ammónia-jegekben (fiz. BSc, MSc, TDK)
Dr. Hunyadi Mátyás	Nanorészecskék optikailag aktív gerjesztései ionnyaláb-indukált folyamatokban (fiz. BSc, fiz. MSc, kém. MSc)

- Dr. Huszánk Róbert –
Dr. Sulik Béla** Ionbombázás által keltett sugárkárosodás folyadékokban és szilárd anyagokban (fiz. BSc, MSc, TDK)
- Dr. Kiss Gábor** 1. Extrém neutrongazdag ritkaföldfém magok béta-bomlásának vizsgálata (fiz. BSc, TDK)
2. A $^{86}\text{Kr}(\alpha, n)^{89}\text{Sr}$ magreakció vizsgálata és a könnyű neutron-gazdag magok keletkezése szupernóva robbanásokban (fiz. MSc)
- Dr. Krasznahorkay
Attila** 1. Ritka atommag-átmenetek precíziós vizsgálata (fiz. BSc, MSc)
2. Axionszerű részecske keresése atommag-átmenetekben (fiz. BSc, MSc)
3. A standard modellen túli fizikára (sötét anyag) utaló jelek keresése atommag-átmenetekben (fiz. BSc, MSc)
- Dr. Lévai Géza** A kvantummechanika alapegyenletei és szimmetriái (fizikus, informatikus-fizikus, fizikus MSc, fizika BSc, TDK)
The fundamental equations of quantum mechanics and their symmetries (physicist BSc, MSc)
- Dr. Mezei János Zsolt** 1. Asztrofizikailag releváns molekulaionok fragmentációja. (villamosmérnök, informatikus, fizikus, BSc, MSc)
2. A hidrogén molekula fotoionizációja. (villamosmérnök, informatikus, fizikus, BSc, MSc)
- Dr. Molnár Mihály** Légköri üvegházhatású gázok mennyiségének és izotópösszetételének mérési módszerfejlesztése és alkalmazása (fiz./környezetmérnök/geológus/kémia BSc vagy MSc)
- Dr. Nyakó Barna –
Dr. Kuti István** Magfizikai töltött részecske-detektorok jeleinek digitális feldolgozásával kapcsolatos kísérletek és programfejlesztések (mérnök-inf. BSc, MSc, fiz. tanár, fiz. BSc, MSc, villamosmérnök BSc, TDK)
- Dr. Orbán Andrea** Ionok és semleges részecskék kölcsönhatása ultrahideg hőmérsékleten (fiz. BSc, MSc és fiz. tanár)
Ion-neutral interaction at ultracold temperatures (physicist BSc)
- Dr. Palcsu László** 1. Mezőgazdasági területek nitrátszennyezése időbeliségének, eredetének és a denitrifikációjának vizsgálata (bármely szak BSc, MSc, TDK)
1. Study of timing, origin and denitrification of nitrate pollutant in shallow groundwater at agricultural areas (any program BSc, MSc, TDK)
2. Paleohőmérsékletek rekonstrukciója különféle geológiai lenyomatokon (bármely szak BSc, MSc, TDK)
2. Palaeotemperature reconstruction on different geological proxies (any program BSc, MSc, TDK)
- Papp Enikő –
Dr. Angyal Anikó** Városi aeroszol koromtartalmának vizsgálata aethalometerrel (környezettan BSc, MSc; környezetmérnök BSc, MSc; fizika BSc, MSc)
- Dr. Pál Károly** Kvantumkorrelációk vizsgálata (fiz. BSc)
- Dr. Rácz Richárd** Részvétel Labview-alapú vezérlő, adatgyűjtő és kiértékelő rendszer fejlesztésében. (villamosmérnök, informatikus, fizikus, BSc, MSc)

- Dr. Sulik Béla – Kovács Sándor** Az ionsugár-terápia fizikai folyamatai (fiz. BSc, MSc, TDK)
- Dr. Szücs Tamás** A Napban és csillagokban zajló hidrogénfúzió reakcióinak vizsgálata (fiz. BSc, MSc, tanár, TDK)
- Dr. Takáts Viktor** Ipari minták felületvizsgálata atomi szinten XPS és LEIS mérési módszerekkel (fiz. MSc).
- Dr. Timár János – Dr. Sohler Dorottya** Deformált atommagok alakjának és alakváltozásának vizsgálata a forgási állapotok kísérleti tanulmányozásával (fiz. tanár, fiz. BSc, MSc, TDK)
- Dr. Tőkési Károly**
1. Töltött részecskék és kapillárisok kölcsönhatásainak vizsgálata (fiz. BSc, MSc, TDK)
 2. Töltött részecskék energiavesztése és fékeződése felületek környezetében (u.a.)
 3. Egyszerű és többrétegű mintákban lejátszódó transzport folyamatok vizsgálata (u.a.)
 4. Felületi effektusok vizsgálata (u.a.)
 5. Többszörös szórások atomi ütközésekben (u.a.)
 6. Lézer-atom, lézer-molekula kölcsönhatások elméleti vizsgálata (u.a.)
 7. Anyagutánpótlás fizikai folyamatai fúziós plazmákban (u.a.)
 8. Fúziós kutatásokhoz kapcsolódó atom- és felületfizikai adatok elemzése (u.a.)
 9. Mikroelem nyomok csontokban (biológia tanár, biol. BSc, MSc, TDK)
 10. Töltött részecskék élettani hatása sejtekre és sejtalkotókra (biomérnök, biol./fiz. MSc)
- Dr. Tőkési Károly- Dr. Ódor Géza (KFKI MFA)** Felületi mintázatképződés GPU-szimulációs vizsgálata (fiz. BSc, MSc, TDK)
- Dr. Ujvári Balázs**
1. Szimulációs technikák a nagyenergiás részecskefizikában (fiz. BSc, MSc)
 2. Szimulációs technikák az orvosi képalkotásban (fiz. BSc, MSc)
 3. SiPM alapú szcintillációs detektorok tervezési, tesztelési folyamatai a CMS BTL aldetektor számára (fiz. BSc, MSc)
 4. sPHENIX TPC aldetektorának HV tesztelőjének kivitelezése, tesztelése (fiz. BSc, MSc)
 5. Terepi szcintillációs detektorok tervezése és tesztelése (fiz. BSc, MSc)
 6. Szálló por mérő hálózat tervezése és adatainak feldolgozása (fiz. BSc, MSc)
 7. Big Data módszerek alkalmazása a sokcsatornás szcintillációs detektor trigger rendszerében (fiz. BSc, MSc)
 8. GEANT4 simulations in high energy particle physics (fiz. BSc, MSc)
 9. GEANT4 simulations in medical physics (fiz. BSc, MSc)

A kiírt témákra a hallgatók az intézetek által küldött tájékoztató alapján jelentkezhetnek. Elmulasztása esetén a hallgató csak a következő félév témakiírására jelentkezhet. A hallgatók jelentkezése, valamint a hallgatói jelentkezések oktatói jóváhagyása és intézeti elfogadása a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben történik. A jelentkezések elfogadásáról minden félévben november/április 30-ig döntenek az illetékes intézetek. Az elfogadás annak a félévnek a végén lép életbe, amikor a hallgató az oklevélkövetelményben előírt számú szakmai és minőségi kreditszámot megszerezte. A záródolgozat kreditek a következő félévtől kezdődően szerezhetők meg.

Proton-indukált reakciók vizsgálata és felhasználása neutron-detektorok hatásfokának meghatározásában

TDK, szakdolgozat vagy diplomamunka téma környezetben, fizikus, fizika tanár, BSc, Msc hallgatók részére

Témavezető: Dr. Csedreki László

Magfizikai ismeretünk bővítésének egyik hatékony eszköze a magreakciókban keletkezett kölcsönhatási termékek (könnyű és nehéz töltött részecskék, elektronok, gamma fotonok, neutronok stb.) vizsgálata. A nukleáris asztrofizika célja a csillagok fejlődésének, energiatermelésének és a környezetünkben lévő elemek keletkezésének megértése. Ehhez a csillagokban lejátszódó magreakciók nagy pontosságú vizsgálata és ezen reakciók sebességének pontos megadása szükséges. Ezt sok esetben a reakcióban keletkezett neutronok detektálásán keresztül valósítjuk meg. A kölcsönhatásban keltett neutronok energiájának és számának meghatározása komplex kísérleti problémák megoldását igényli. Az egyik ilyen, az alkalmazott neutron detektálási rendszer detektálási hatásfokának meghatározása, mely elsősorban a jól ismert hozamú, monoenergetikus neutronokat kibocsájtó reakciók segítségével valósítható meg.

Például a $^{51}\text{V}(p,n)^{51}\text{Cr}$ magreakció, jelenleg elfogadottan alkalmas < 1 MeV alatti energiájú neutronok keltésére a fent leírt elvárásoknak megfelelően. Sok esetben azonban a nukleáris asztrofizika szempontjából releváns reakciókban ennél nagyobb energiájú neutronok detektálására van szükség. Az aktivációs technika és neutron- és gamma-detektálás kombinálása révén lehetővé válhat ezen reakció hatáskeresztmetszetének pontosabb meghatározására és > 1 MeV feletti neutronforrásként történő alkalmazása. Ezen túl lehetővé válik a reakció szélesebb körű alkalmazása a radiobiológia, a detektorkalibráció és a vékonyréteg aktivációs technika terén.

A hallgató feladata kiterjed a különböző proton indukált reakciók (elsősorban a $^{51}\text{V}(p,n)^{51}\text{Cr}$ reakció) alkalmazhatóságának vizsgálatára, (amely megköveteli az elsősorban angol nyelvű szakirodalom tanulmányozását), továbbá a tesztmérések összeállításában, kivitelezésében és kiértékelésében való részvételre is.

Elérhetőség:

Dr. Csedreki László

csedreki.laszlo@atomki.mta.hu

4026 Debrecen, Bem tér 18/c

ATOMKI, IX. épület, 107 szoba.

Telefon: +36 52 509 200, 11337 mellék

Protonindukált magreakciók vizsgálata magnézium céltárgyakon

TDK, szakdolgozat vagy diplomamunka téma környezetben, fizikus, fizika tanár, BSc, Msc hallgatók részére

Témavezető: Dr. Csedreki László, Dr. Kiss Árpád Zoltán

Napjainkra az elemanalitikai vizsgálatokra alkalmazható ionnyaláb-analitikai (IBA) módszerek (PIGE, PIXE, NRA, EBS) széles körben terjedtek el, mivel teljesítik a gyors, érzékeny és multielemes összetétel meghatározás követelményét, és mindemellett a lehető legkisebb mértékben roncsolják a vizsgálni kívánt anyagot. Ezáltal széleskörű alkalmazásra találtak az anyagtudományi, környezeti és a kulturális örökség tárgyainak vizsgálatában.

A gamma-detektáláson alapuló PIGE módszer kvantitatív alkalmazásának feltétele az adott elem lejátszódó magreakció lejátszódási valószínűségének (hatáskeresztmetszet) ismerete.

A magnézium mennyiségének és eloszlásának vizsgálata központi tárgya számos ipari, gyógyászati alkalmazásnak és geológiai, környezeti és archeometriai kutatásnak. Célunk a magnézium magokon végbemenő reakciók vizsgálata gamma-spektroszkópia segítségével az Atomki világszínvonalú részecskegyorsító laboratóriumában. Ezzel hozzájárulva a PIGE módszer fejlesztéséhez és új magfizikai információk megszerzéséhez.

A hallgató feladata kiterjed az elsősorban angol nyelvű szakirodalom tanulmányozására, továbbá a tesztmérések összeállításában, kivitelezésében és kiértékelésében való részvételre is.

Elérhetőségek:

Dr. Csedreki László

csedreki.laszlo@atomki.mta.hu

4026 Debrecen, Bem tér 18/c

ATOMKI, IX. épület, 107 szoba.

Telefon: +36 52 509 200, 11337 mellék

Dr. Kiss Árpád Zoltán

kiss.arpad@atomki.mta.hu

4026 Debrecen, Bem tér 18/c

ATOMKI, VIII. épület, 103 szoba.

Stabilitási sávtól távoli atommagok szerkezetének vizsgálata radioaktív nyalábokkal

TDK, szakdolgozat vagy diplomamunka téma fizikus, fizika tanár, fizika BSc, fizikus Msc hallgatók részére

Témavezető: Dombrádi Zsolt, Kunné Sohler Dorottya

Az atommagok szerkezetéről alkotott jelenlegi tudásunk javát a $\delta\mathcal{L}$ -stabilitási völgyben és a környékén végzett kísérletekből szereztük meg. Közelítve a nukleon-elhullatási vonalához az atommagokban a proton-neutron arány jelentősen eltolódik a stabil izotópokban megszokotthoz képest és ennek következtében számos új jelenség bukkan fel: megváltoznak a nemesgázokhoz hasonlóan különösen stabil szerkezettel és gömbölyű alakkal rendelkező atommagokra jellemző mágikus számok; az ismert proton/neutron-héjzáródások eltűnnek és újak jönnek létre; a gyengén kötött neutronok glóriát hoznak létre a magtörzs körül. Az utóbbi évtizedben a radioaktív ionnyalábok megteremtették a lehetőséget ezen jelenségek kísérleti vizsgálatára. A kutatómunka célja az extrém proton-neutron aránnyal rendelkező egzotikus atommagok szerkezetének minél jobb megismerése Európa és Japán vezető laboratóriumaiban végzett kísérletekkel. A hallgató feladata elsősorban a kísérletekben gyűjtött adatok számítógépes kiértékelése lesz, de lehetőség nyílik a külföldön végzendő kísérletekben való részvételre, érdeklődés esetén szoftver illetve detektor fejlesztésre is.

ATOMKI, XII. épület, II. emelet 205-ös szoba.

Telefon: +36-52-509243; e-mail: domb@atomki.hu és sohler@atomki.hu

Dr. Elekes Zoltán

1. Ritka elemek keletkezésének vizsgálata atommag-reakciók segítségével
2. Egzotikus atommagok szerkezetének vizsgálata és szerepük az elemek keletkezésében

Kísérleteink a nukleáris asztrifikában fontos, az égi objektumok működésének és az elemek keletkezésének megértésében szerepet játszó atommag-reakciókat célozzák meg. Az egyik téma az úgynevezett asztrifikai p-folyamat feltérképezésére irányul. Olyan atommag-reakciókat vizsgálunk, amelyekkel közelebb juthatunk a harmincöt, igen ritka p-atommag keletkezésének rejtélyéhez. A másik téma az igen instabil atommagok területére vezet. Rövid élettartamuk ellenére kulcsszerepet játszanak a nehéz elemek keletkezésében. Olyan atommag-reakciókat tanulmányozunk, amelyek során radioaktív ionnyalábot alkalmazunk. Mindkét témát nemzetközi együttműködésben végezzük hazai és külföldi gyorsítóberendezések segítségével.

Témavezető

Dr. Hunyadi Mátyás

Téma címe

Nanorészecskék optikailag aktív gerjesztései ionnyaláb-indukált folyamatokban (fiz. BSc, fiz.MSc, kém. MSc)

Rövid leírás

Félvezetők nanorészecskéi általában erős lumineszcenciát mutatnak fotoindukált folyamatokban, viszont töltött részecskék által gerjesztett állapotaik és azok bomlási útvonalai alig ismertek. Az utóbbi évtizedben a félvezetők egy különleges csoportja, a perovszkitok kerültek a kutatások középpontjába, melyek egyedi elektronikus szerkezetüknek köszönhetően az újgenerációs napelemek és optoelektronikai eszközök fejlesztésében kaphatnak jelentős szerepet. Ezen túlmenően fotolumineszcenciájuk kutatása a bennük keltett töltéshordozók és excitonok dinamikus tulajdonságainak hátterét próbálja feltárni, rávilágítva alkalmazásuk újabb lehetőségeire, mint nemlineáris kvantumoptikai elemek, nanoszenzorok, diagnosztikai nyomjelzők, vagy qubitek kvantumszámítógépekben. Radioaktív forrásokból vagy gyorsítókból származó ionnyalábok által kiváltott gerjesztések nanokristályon belüli fejlődése egy eddig ismeretlen terület, számos lehetőséget kínálva félvezető nanorészecskék új mikroszkopikus tulajdonságainak és belső folyamatainak megismerésére.

A hallgatók megismerkednek a perovszkit nanokristályok különböző szintézis eljárásaival, karakterizálási módszereivel, valamint ionnyalábokkal történő besugárzások technikáival. Az előállított nanokristályok és belőlük épített vékonyréteg vizsgálatára elektronmikroszkópokat, Röntgen-szórást, tömeg- és elektronspektrometriát alkalmazunk. Az optikai mérésekhez a legmodernebb nukleáris mérés technikát és kiértékelési módszereket alkalmazunk, melyek megismerése más területeken is a hallgatók hasznára válhat későbbi kutatómunkájuk során.

A kvantummechanika alapegyenletei és szimmetriái (Lévai Géza)

A kvantummechanikai rendszerek viselkedését dinamikai egyenletek írják le. Ezek közül a legismertebb a Schrödinger-egyenlet, amely nemrelativisztikus problémák leírását teszi lehetővé. A téma keretében az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet egzakt megoldása a feladat különféle potenciálok (egydimenziós, centrális, esetleg periodikus vagy többdimenziós nem centrális) esetében. Szintén feladat még a problémák szimmetriáinak vizsgálata. Ezek között szerepel a szuperszimmetria, amely keretében lényegében azonos energiaspektrummal rendelkező potenciálok hozhatók kapcsolatba, egyes Lie-algebrákon alapuló szimmetriák (spektrumgeneráló és potenciálalgebrák) és a PT-szimmetria, amellyel olyan komplex potenciálok vizsgálhatók, amelyek valós energia-sajátértékekkel rendelkeznek. Emellett a relativisztikus kvantummechanika egyenleteinek (Dirac-egyenlet, Klein-Gordon-egyenlet) tanulmányozása is szóba jöhet.

A téma főleg a matematika iránt érdeklődő hallgatók számára ajánlható. A konkrét munka leginkább "papíron ceruzával" történő számolásokat igényel, de egyes részfeladatokhoz számítógépes programok (Fortran, Maple, Mathematica) alkalmazása is szükséges lehet. Az angol nyelvű szakirodalom miatt az angol nyelv ismerete (legalább olvasásai szinten) alapkövetelmény.

(fizikus, informatikus-fizikus, fizikus MSc, fizika BSc, TDK)

The fundamental equations of quantum mechanics and their symmetries (Géza LÉVAI)

Quantum mechanical systems are described by dynamical equations. The most well-known of these is the Schrödinger equation, which describes non-relativistic problems. The main task is the exact solution of the time-independent Schrödinger equation for various (one-dimensional, central, or possibly periodic or multi-dimensional) potentials. Investigations also extend to the symmetries of these problems. These include supersymmetry, which connects potentials possessing essentially the same energy spectrum, symmetries based on certain Lie algebras (spectrum generating and potential algebras) and PT symmetry, which describes complex potentials that may nevertheless, possess real energy eigenvalues. Additionally, the dynamical equations of relativistic quantum mechanics (the Dirac and Klein-Gordon equation) may also be considered.

This topic may be recommended to students, who are interested in and have a firm knowledge of mathematics. Actual work will mainly mean analytical calculations (i.e. using "pencil and paper"), but for some particular problems computer codes (Fortran, Maple, Mathematica) may also be necessary.

(physicist BSc, MSc)

Dr. Krasznahorkay Attila
kraszna@atomki.mta.hu
Tel: 11344

- 1. Ritka atommag-átmenetek precíziós vizsgálata**
- 2. Axionszerű részecske keresése atommag-átmenetekben**
- 3. A standard modellen túli fizikára (sötét anyag) utaló jelek keresése atommag-átmenetekben**

Az elmúlt években egy új kutatási irányt indítottunk el az MTA Atomki-ben. Ezzel bekapcsolódtunk korunk egyik legnagyobb kihívását jelentő sötét-anyag kutatásokba, és világhírnévre tettünk szert egy 2016-ban publikált munkánkkal [1].

Kísérletünkben a ^8Be atommag gerjesztett állapotainak elektron-pozitron belső párkeltéssel történő bomlását vizsgáltuk [1]. A ^8Be különböző energiájú gerjesztett állapotait a $^7\text{Li}(p,\gamma)^8\text{Be}$ rezonáns proton befogási reakcióval állítottuk elő. Az elektronok és pozitronok szögkorrelációjában szignifikáns (6.8σ), csúcsszerű anomáliát figyeltünk meg a 18.15 MeV-es gerjesztett állapot bomlása esetén $\Theta=140^\circ$ -nál. Ez az anomália jól értelmezhető egy új, kis tömegű, semleges bozon keletkezésével, és e^+e^- párra történő bomlásával. Az anomália értelmezésére magfizikai folyamaton alapuló magyarázatot eddig senkinek sem sikerült találni.

Az Atomki-ben a kísérleti magfizikai kutatásoknak sok évtizedes hagyománya van. Ezt felhasználva építettünk egy, a világon egyedülálló spektrométert az új részecske bomlásakor keletkező e^+e^- párok vizsgálatára. A kísérleteket Debrecenben, az általuk épített spektrométerrel végeztük.

Eredményünk, amire eddig több mint 140 pozitív, főleg elméleti értelmezéssel kapcsolatos hivatkozást kaptunk, felkeltette a nemzetközi fizikus társadalom érdeklődését. Új kísérleteket indítottak, illetve terveznek indítani szerte a világon a legnagyobb laborokban, köztük a CERN-ben is, hogy ezen új részecske tulajdonságait jobban megismerjék. Az új bozon a részecskefizika jelenlegi standard modelljével sem értelmezhető. Feng és munkatársai [2] egy új, ötödik kölcsönhatás mértékbozonjának azonosítják, és összefüggésbe hozzák a sötét anyaggal. Mások a Weinberg és Salam által korábban bevezetett axionhoz hasonló részecskeként értelmezték [3]. Ezen kívül még számos más értelmezés is született az irodalomban, amiket további kísérletekkel szeretnénk értelmezni.

A hallgató feladata lesz: részvétel a magfizikai mérés összeállításában, kivitelezésében, kiértékelésében és az adatok értelmezésében.

(fizikus MSc, fizika BSc, TDK)

[1] A.J. Krasznahorkay et al., Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 042501; Fizikai Szemle 2016/7-8 248.

[2] J. Feng et al., Phys. Rev. Lett. 117 (2016) 071803

[3] U. Ellwanger and S. Moretti, JHEP 11 (2016) 039;

Asztrofizikailag releváns molekulaionok fragmentációja

TDK, szakdolgozat vagy diplomamunka téma mérnök-inf. BSc, MSc, fiz. tanár, fiz. BSc, MSc, villamosmérnök BSc hallgatók részére

Témavezető: Mezei János Zsolt

A kutatási projektben megfogalmazott alapkérdés a csillagközi térben fellelhető molekulaionok reaktivitásához kötődik. Az egyik különösen fontos kérdés, amelyet megszeretnénk válaszolni az, hogy az elektronbefogást követő energiaátrendeződés miként eredményez drasztikus struktúraváltozásokat a keletkezett molekulában (ionizáció, gerjesztés, disszociáció). Más szavakkal, a lassan repülő kő vagy a gyors puskagolyó töri be az üveget?

Az elektron-indukált elemi folyamatok elméleti tárgyalása nehéz kihívás, hiszen magába foglalja több fragmentációs kontinuum (ion+elektron, atom+atom, anion+kation) koherens kölcsönhatását a végtelen számú Rydberg-állapot sorozatokkal, amelyet ezen kívül még az elektron és a mag szabadsági fokok nemadiabatikus csatolása is kiegészít.

Az elméleti számolásaink eredményét az utóbbi években fejlesztett tároló gyűrűn végzett kísérleti eredményekkel hasonlítjuk össze. Mivel a részecskék közötti kölcsönhatás adott (Coulomb) az összevetés a releváns folyamatokról (direkt vagy rezonáns) ad információt.

Egy olyan teljes szórás programcsomagot szeretnénk kifejleszteni, amely egyedülálló módon foglalja magába az összes mechanizmust, kölcsönhatást (vibrációs, rotációs, spin-pálya), magasan gerjesztett kötött és disszociatív molekulaállapotot és szimmetriát.

A kis- és nagyenergián produkált szórás adatok nagymértékben elősegítik a csillagközi tér kinetikus modellezését.

ATOMKI, I. épület, I. emelet 125-ös szoba.

Telefon: +36-52-509241; e-mail: mezei.zsolt@atomki.mta.hu

A hidrogén molekula fotoionizációja

TDK, szakdolgozat vagy diplomamunka téma mérnök-inf. BSc, MSc, fiz. tanár, fiz. BSc, MSc, villamosmérnök BSc hallgatók részére

Témavezető: Mezei János Zsolt

A csillagközi molekuláris felhőket, valamint az ősrobbanást követő világegyetem történetét leíró modellekben drasztikus módosításokra van szükség még a legegyszerűbb atomokra és molekulákra vonatkozó adatokban is. Ugyanis már az univerzum leggyakoribb és egyben legegyszerűbb kétatomos molekulája, a hidrogén molekula esetében is a meglévő kinetikus modellek figyelmen kívül hagyják a gerjesztett molekulaállapotok vibrációs szintjeinek hozzájárulását a molekulában lejátszódó különböző elemi radiatív és ütközési folyamatokban.

A jelen kutatási téma a hidrogén molekula spektroszkópiái tanulmányozása mellett a fotoionizációs, teljesen differenciális (state-to-state) hatáskeresztmetszetek meghatározását célozza meg olyan VUV fotonok esetén, amelyek energiája molekula kezdeti állapota és a molekulaion disszociációs energiája közé esik.

ATOMKI, I. épület, I. emelet 125-ös szoba.

Telefon: +36-52-509241; e-mail: mezei.zsolt@atomki.mta.hu

Tudományos Diákköri/Szakdolgozat/Diplomamunka téma

*Mérnök-informatikus, fizika tanár, fizika és fizikus, valamint villamosmérnök szakos hallgatók részére
(mérnök-inf. BSc, MSc, fiz. tanár, fiz. BSc, MSc, villamosmérnök BSc, TDK)*

Magfizikai töltőtrészecske-detektorok jeleinek digitális feldolgozásával kapcsolatos kísérletek és programfejlesztések

Témavezetők: *Dr. Nyakó Barna – Dr. Kuti István (ATOMKI)*

Az ATOMKI és a Debreceni Egyetem Információtechnológiai Tanszéke kutatói különböző (európai és dél-afrikai) nehézion-gyorsítók mellett folyó magfizikai kísérletekben vettek/vesznek részt. Ezekben a mérésekben komplex detektorrendszereket használunk, melyek fő eleme egy, a gamma-sugárzás detektálására szolgáló sokelemes Ge-detektorrendszer, amelyhez töltőtrészecske- és neutron-segéd-detektorrendszerek kapcsolódnak. Az ATOMKI-ban korábban egy CsI(Tl) szcintillációs kristályra alapozott töltőtrészecske-segéd-detektorrendszer került kifejlesztésre, amelyben a szcintillátorok jeleit fotodióda érzékeli. A detektorok könnyű töltött részecskék (protonok, alfák) energiájának és típusának meghatározására szolgálnak, amit egy részecske-diszkriminációt megvalósító, ATOMKI-ban kifejlesztett, analóg jelfeldolgozó elektronika biztosított. A technológiai fejlődés, valamint a gamma-detektálást végző új Ge-detektorrendszer, az AGATA, miatt azonban szükségessé vált mind a CsI detektorok, mind az azok jeleinek feldolgozására szolgáló elektronika modernizálása. Ennek keretében megvalósítottunk egy, az AGATA jelfeldolgozó elektronikájával kompatibilis új elektronikát, ami a CsI detektorok jeleinek digitális feldolgozásán alapul. Emellett folyamatban van az ezekhez a detektorokhoz közvetlenül csatolandó új analóg-elektronika (előerősítők) létrehozását célzó detektorfejlesztési munka.

A TDK/diplomamunka keretében a hallgatók bekapcsolódnak a detektorfejlesztéssel kapcsolatos elektronikai és magfizikai tesztmérésekbe, illetve a digitális jelfeldolgozáshoz szükséges programozási feladatok megoldásába. Lehetőség nyílik digitális jelfeldolgozó rendszerrel kapott magfizikai adatok feldolgozására szolgáló – már működő – programrendszer alkalmazására, s ennek továbbfejlesztésével kapcsolatos elképzelések kipróbálására is.

A témát lehetőség szerint olyan hallgatóknak szánjuk, aki(k) C/C++ és/vagy JAVA programozási nyelvekben már alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek; a hallgatók feladata részt venni az ATOMKI-ban folyó detektorteknikai mérésekben, a detektorok jeleinek feldolgozásával összefüggő egyes programozási feladatok megoldásában, mely tevékenység során a digitális jelfeldolgozási technikára vonatkozó ismeretek szerezhetők.

Elérhetőségeink:

e-mailek: nyako@atomki.hu
kuti@atomki.hu

telefonok: közv.: (52) 509 219, közp.: (52)509 200/11310 mellék; ill.
(52)509 200/11271 mellék

munkahelyek: ATOMKI, XII. ép.: 102, ill. 214 szobák

Diplomamunka témakiírás fizika és villamos mérnök BSc hallgatóknak

Ionok és semleges részecskék kölcsönhatása ultrahideg hőmérsékleten

Szakedolgozat, diplomamunka téma, fiz., fiz. tanár BSc, MSc hallgatók részére

Témavezető: Orbán Andrea

A javasolt kutatási téma az ultrahideg ($< 1 \mu\text{K}$) kvantumgázok gyorsan növekvő területéhez kapcsolódik. Az elmúlt évtizedekben jelentős eredményeket értek el semleges részecskék lézeres hűtése és csapdázása terén (Fizikai Nobel-díj 1997, 2001), illetve ezzel párhuzamosan ezen kvantum rendszerek modellezésében is. Külső terek segítségével ezen rendszerek kvantum szinten kontrollálhatók, így például megvalósították a Van der Waals kölcsönhatással jellemezhető atomi gázok kvantum degeneráltságát. Később ezeket a vizsgálatokat kiterjesztették molekulákra is, ugyanis a külső kontrollhoz [1] a jóval gazdagabb belső szerkezet több lehetőséget biztosít. Időközben atomi ionok lézeres hűtése is lehetővé vált, amivel sikerült jóval 1 K alatti ionokat csapdázni (Nobel-díj 2012). Ezen két technika összevonásával megvalósítható hibrid csapdák lehetősége, vagyis hideg atomoknak hideg ionokkal való keverése, világszerte több kísérleti csoport érdeklődését felkeltette. A töltés és indukált dipól közötti hosszú hatósugarú kölcsönhatáson keresztül a hideg semleges gázokban elhelyezett hideg ionok szennyeződésként viselkednek, és alapvetően meghatározzák a gáz dinamikáját. Az ilyen típusú rendszerek felbecsülhetetlen terepként szolgálnak az ion-semleges részecske kölcsönhatás, az ultrahideg kémia [2], a soktest kvantum-rendszerek vizsgálatához, valamint hozzájárulnak a kondenzált anyagok szimulációjához és kvantum információs protokollok kidolgozásához [3].

A pályázat, a hibrid csapdákhoz kapcsolódva, ionok és semleges részecske rendszerek dinamikájának elméleti modellezését tűzte ki célul, azok teljes kvantum-kontrolljának megvalósításáért. Ezekben a kísérletekben az alkálifém atomi gázokban elhelyezett alkáliföldfém ionok metastabil, gerjesztett állapotai jelentős mértékben populálódnak a hűtést szolgáló lézerek jelenléte miatt. Az alapállapotban levő atom és gerjesztett állapotban levő ion között több olyan folyamat játszódhat le, például töltéscserélődés vagy radiatív asszociáció, ami a részecskék csapdából való elvesztéséhez vezetnek. Mivel a kísérletek lehetővé teszik az ütköző felek jól meghatározott kvantumállapotba való létrehozását, állapotselektív hatáskeresztmetszeteket és ütközési rátákat fogunk meghatározni a reakciótermékek kontrolljának érdekében. Az ütközés leírását laboratóriumi rendszerben [4, 5], míg az ütköző felek szerkezetére vonatkozó Born-Oppenheimer közelítésen alapuló számolást a molekula-ion rendszerében végezzük el [6, 7]. A dinamikai számoláshoz szükséges a két koordinata rendszer közötti transzformáció elvégzése az impulzusmomentum-algebra körültekintő figyelembevételével. A hallgató ezt a koordináta rendszer transzformációt fogja elvégezni a kísérletileg releváns ${}^6\text{Li}(2s) - {}^{40}\text{Ca}^+(4d)$ ütközési rendszer esetén [8].

[1] O. Dulieu and C. Gabbanini, Rep. Prog. Phys. **72**, 086401 (2009).

[2] S. Willitsch, M.T. Bell, A.D. Gingell, S.R. Procter and T.P. Softley, Phys. Rev. Lett. **100**, 043203 (2008).

[3] M. Tomza, K. Jachymski, R. Gerritsma, A. Negretti, T. Calarco, Z. Idziaszek and P.S. Julienne, Rev. of Mod.Phys. **91**, 035001 (2019)

[4] Xie T., Lepers M., Vexiau R., Orbán A., Dulieu O., Bouloufa-Maafa N., Optical Shielding of Destructive Chemical Reactions between Ultracold Ground-State NaRb Molecules, Physical Review Letters **125**, 153202 (2020)

[5] T. Xie, A. Orbán, X. Xing, E. Luc-Koenig, R. Vexiau, O. Dulieu, N. Bouloufa-Maafa, Engineering long-range interactions between ultracold atoms with light, submitted to J. Phys. B (2021)

[6] A. Orbán, R. Vexiau, O. Kriegelsteiner, H.C. Naegerl, O. Dulieu, A. Crubellier, N. Bouloufa-Maafa, Model for the hyperfine structure of electronically excited KCs molecules, Phys. Rev. A **92**, 032510 (2015)

[7] A. Orbán, T. Xie, R. Vexiau, O. Dulieu, N. Bouloufa-Maafa, Hyperfine structure of electronically-excited states of the ${}^{39}\text{K}{}^{133}\text{Cs}$ molecule, Journal of physics B: Atomic Molecular and Optical Physics **52**, 135101 (2019)

[8] R. Saito, S. Haze, M. Sasakawa, R. Nakai, M. Raoult, H.D. Silva, O. Dulieu and T. Mukaiyama, Phys.Rev.A **95**, 032709 (2017).

ATOMKI, I. épület, 1. emelet 121-es szoba.

Telefon: +36-52-509200/11262; e-mail: orban.andrea@atomki.hu

Ion-neutral interaction at ultracold temperatures

The proposed research topic is related to the rapidly growing research field of ultracold ($< 1 \mu\text{K}$) quantum gases. In the last decades impressive experimental results have been obtained thanks to the progresses in the laser cooling and trapping techniques of neutral particles (Nobel Prizes in Physics in 1997, 2001) in parallel with outstanding theoretical developments to model such novel quantum matter. Particles can now be controlled at the quantum level limit using external fields. As an example, we mention the observation of quantum degeneracy of atoms weakly interacting via the Van der Waals interaction. Later, such studies have been extended to molecules, characterized by a more complex structure than atoms, thus allowing for more possibilities for quantum control [1]. Meanwhile laser cooling techniques were also applied to trap atomic ions at low temperatures too, well below 1 Kelvin (Nobel Prize 2012). Therefore, the idea of realizing hybrid traps putting together cold atoms and ions came up in many research groups around the world. Due to the long-range charge-induced dipole interaction, cold ions embedded in a cold neutral gas act as impurities, strongly modifying the dynamics. Such systems appear as amazing platforms to study ion- neutral interactions and ultracold chemistry [2], many-body quantum physics, and to explore ways toward quantum simulation of condensed matter and quantum information protocols [3].

The proposal is related to the theoretical modelling of the dynamics of ion-neutral systems in connection with hybrid traps in order to design ways for their full quantum control. In such experiments the metastable state of alkaline-earth ion embedded in the neutral alkali-metal atomic gas is considerably populated due to the presence of the cooling lasers. The internal energy can be dissipated through different processes as charge exchange, excitation quenching or radiative association, which lead to unwanted particle losses from the trap. As the colliding particles could be prepared in specific internal quantum states, using e.g. magnetic field, we will determine state- to-state cross sections and rate coefficients to propose ways to control reaction products. The dynamical calculations must be performed in the laboratory frame [4, 5], meanwhile the structure calculation of the colliding system based on Born-Oppenheimer approximation is performed in the molecular-ion frame [6, 7]. Thus, special care must be taken about the mathematical transformation between these two frames, involving delicate angular momentum algebra. The candidate will perform the frame transformation for the ${}^6\text{Li}(2s) - {}^{40}\text{Ca}^+(4d)$ system, subject of recent experimental interest [8].

[1] O. Dulieu and C. Gabbanini, *Rep. Prog. Phys.* **72**, 086401 (2009).

[2] S. Willitsch, M.T. Bell, A.D. Gingell, S.R. Procter and T.P. Softley, *Phys. Rev. Lett.* **100**, 043203 (2008).

[3] M. Tomza, K. Jachymski, R. Gerritsma, A. Negretti, T. Calarco, Z. Idziaszek and P.S. Julienne, *Rev. of Mod.Phys.* **91**, 035001 (2019)

[4] Xie T., Lepers M., Vexiau R., Orbán A., Dulieu O., Bouloufa-Maafa N., *Optical Shielding of Destructive Chemical Reactions between Ultracold Ground-State NaRb Molecules*, *Physical Review Letters* **125**, 153202 (2020)

[5] T. Xie, A. Orbán, X. Xing, E. Luc-Koenig, R. Vexiau, O. Dulieu, N. Bouloufa-Maafa, *Engineering long-range interactions between ultracold atoms with light*, submitted to *J. Phys. B* (2021)

[6] A. Orbán, R. Vexiau, O. Kriegelsteiner, H.C. Naegerl, O. Dulieu, A. Crubellier, N. Bouloufa-Maafa, *Model for the hyperfine structure of electronically excited KCs molecules*, *Phys. Rev. A* **92**, 032510 (2015)

[7] A. Orbán, T. Xie, R. Vexiau, O. Dulieu, N. Bouloufa-Maafa, *Hyperfine structure of electronically-excited states of the ${}^{39}\text{K}{}^{133}\text{Cs}$ molecule*, *Journal of physics B: Atomic Molecular and Optical Physics* **52**, 135101 (2019)

[8] R. Saito, S. Haze, M. Sasakawa, R. Nakai, M. Raoult, H.D. Silva, O. Dulieu and T. Mukaiyama, *Phys.Rev.A* **95**, 032709 (2017).

ATOMKI, building I , floor 1., room 121

Telefon: +36-52-509200/11262; e-mail: orban.andrea@atomki.hu

Dr. Rácz Richárd

Részvétel Labview-alapú vezérlő, adatgyűjtő és kiértékelő rendszer fejlesztésében.

(villamosmérnök, informatikus, fizikus, BSc, MSc)

Az MTA Atommagkutató Intézetben üzemel Magyarország egyetlen elektron-ciklotronrezonanciás (ECR) ionforrása, <http://virtualisseta.atomki.hu/index.php?placeid=11>. Ez a berendezés mágnesek és mikrohullámú elektromágneses sugárzás segítségével állít elő nagyon nagy hőmérsékletű plazmát. A plazmából kivont pozitív töltésű ionnyalábot anyagtudományi és atomfizikai kísérletekhez használják. A berendezésben keltett plazma vizsgálata is intenzív fizikai alap kutatások tárgya. A témára jelentkező hallgató felé feltétel a Labview szoftver alapfokú ismerete, önálló használata. A labor munkatársaival közösen két területen végezhető szoftverfejlesztés, melyből szakdolgozat készíthető. (1) Az ECR ionforrás, mint gyorsító vezérlését végző jelenlegi Labview-alapú szoftver egyes blokkjainak továbbfejlesztése. (2) A plazmafizikai kutatásokhoz kapcsolódó eszközök (pl. röntgen detektorok, kamerák) vezérlő, adatgyűjtő és kiértékelő szoftvereinek elkészítése és alkalmazása.

A Napban és csillagokban zajló hidrogénfúzió reakcióinak vizsgálata

TDK, szakdolgozat vagy diplomamunka téma fizikus BSc, MSc, fizika tanár hallgatók részére
Témavezető: Dr. Szücs Tamás (tszucs@atomki.hu, 11374)

A Nap megismerése az emberiség ősidők óta fennálló célja. Mára sokat tudunk az általános tulajdonságairól, működéséről, de a magbéli folyamatokról szinte nincs közvetlen információnk. Az utóbbi pár évben a rendelkezésre álló ultra-tiszta és ultra-érzékeny neutrínó detektorok viszont megnyitották az utat a Nap központjának a vizsgálatához. A fotonokkal ellentétben, amik elveszítik a keletkezésük körüli információt, mire kijutnak a Nap felszínére, a mára nagy pontossággal detektálható neutrínók szintén a magbéli fúziós reakciókban keletkeznek, majd szinte azonnal elhagyják a Napot és eléri a Földet.

Sajnos a neutrínók önmagukban nem elegendők a Nap magjának a tanulmányozásához, ehhez a Nap átfogó és részletes modellezése is szükséges. Az elmúlt évtizedekben kifejlesztett úgynevezett standard Napmodell (SSM) az, ami összeköti a Nap tulajdonságait a mérhető, megfigyelhető mennyiségekkel. Hiába a nagy pontosságú neutrínó észlelések, ha a magfizikai reakciók sebességét nem ismerjük kellő pontossággal, a modell előrejelzései nem lesznek elég precízek a kísérleti adatokkal történő összehasonlításhoz.

Az Atomki Nukleáris asztrofizikai csoportja itt kapcsolódik az előző problémafelvetéshez. Nagy pontosságú kísérleti magfizikai adatokat mérünk, melyek segítségével megadjuk a kulcsot a Nap és a csillagok központjának tanulmányozásához.

A Naptól kisugárzott energia nagyrészt a magban a proton-proton lánc (pp-lánc) reakciói, kisebb részben a szén-nitogén-oxigén (CNO) ciklus termelik. Nehezebb csillagokban ez az arány eltolódik, de továbbra is ez a két reakcióhálózat energia termelése a legfontosabb. Mindkettőben keletkeznek neutrínók is, melyek a mag tanulmányozásának eszközei lehetnek.

Az ATOMKI gyorsítóinak felhasználásával, valamint külföldi együttműködésben két földalatti gyorsító [1] segítségével tanulmányozzuk ezeket a folyamatokat. A jelölt feladata részvétel a mérés összeállításában, kivitelezésében és kiértékelésében.

A téma nagyrészt angol szakirodalom tanulmányozását követeli meg, illetve a külföldi együttműködőkkel való kapcsolattartáshoz szintén az angol nyelv ismerete szükséges.

Érdeklődők a fenti e-mail címen és/vagy melléken kereshetnek.

[1] Szücs Tamás: *Alacsony háttérű magfizikai mérések, avagy a nukleáris asztrofizika kihívásai*. Fizikai Szemle 763-764 (2018) 230.

<http://fizikaiszemle.hu/szemle/tartalom/40#page=16>

Ipari minták felületvizsgálata atomi szinten XPS és LEIS mérési módszerekkel.

Témavezető neve: dr. Takáts Viktor

Helyszíne: Atommagkutató Intézet

(fizikus MSc)

A téma olyan analitikus mérési módszerek használatán és elsajátításán alapul, mint a röntgen gerjesztésű fotoelektron spektroszkópia (XPS - X-ray Photoelectron Spectroscopy) vagy az alacsony energiájú ionszórásos spektroszkópia (LEIS - Low Energy Ion Scattering Spectroscopy). Míg az XPS mind kvalitatív, mind pedig kvantitatív anyagelemzésre alkalmas a minták legfelső 6-8 nm-es rétegvastagságban, a LEIS egzaktul a legfelsőbb egy atomi rétegnek a vizsgálatára alkalmas. A mért spektrumok kiértékelése matematikai eljárások után válik pontosan értelmezhetővé és nem csak az anyagösszetételre, de a kémiai állapotokra is kapunk információt. A kutatási téma során több különböző minta elemzésére kerül sor. Ezek lehetnek laboratóriumban előállított, és lehetnek iparban használt félvezető vagy fém(ötvözet) minták. A téma elsajátításában előnyt jelent a vákuumtechnikai alapok ismerete, mivel mindkét mérési módszer ultranagy-vákuumrendszer használatát igényli.

Dr. habil. Viktor TAKÁTS

Atomki

Institute for Nuclear Research

H-4026 Debrecen, Bem tér 18/C

Mail: ATOMKI, H-4001 Debrecen, P.O.Box 51, Hungary

Tel.: (36) 52 509 200

Fax: (36) 52 416 181

E-mail: takats.viktor@atomki.mta.hu

web: <http://www.atomki.hu/SNMS>

Szakdolgozati, diplomamunka- és TDK-témák

Tókési Károly

Témavezető neve

Dr. Tókési Károly

Érdeklődni:

tokesi@atomki.hu

Téma címe

1. Töltött részecskék és kapillárisok kölcsönhatásainak vizsgálata (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, informatikus-fizikus, TDK)

Az elmúlt évek kísérleti és elméleti kutatásai során a figyelem a hengeres szimmetriájú felülettel vagy határfelülettel rendelkező nanoszerkezetű anyagok vizsgálatára irányult. Ilyenek a nanométerestől a makrométeres tartományig terjedő kapillárisok. A hallgató töltött részecskék esetén egyedi makroszkópikus méretű szigetelő kapilláris terelőképességét tanulmányozná. Mérésekben venne részt melyben az ion-vezetés időfüggését, a kapillárison átjutott ionok szög szerinti eloszlását, valamint a detektált ionok töltésállapotát, mint a hőmérséklet függvényét vizsgálná.

2. Töltött részecskék energiavesztesége és fékeződése felületek környezetében (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, informatikus-fizikus , TDK)

Ha töltött részecskét helyezünk felület környezetébe, akkor töltésünk felületi és tömbi gerjesztéseket indukál, melyeket a töltésünk tükörtöltésével helyettesíthetünk. A tükörtöltés a töltésünkhöz képest a felület ellentétes oldalán helyezkedik el és ellentétes előjelű mint a töltésünk. A töltés és annak tükörtöltése között vonzó kölcsönhatás van, amely mindig a felület felé mozgatja a töltésünket. Ha a töltésünk véges, a felülettel párhuzamos kezdeti sebességgel mozog a felület előtt, akkor egy új erő ébred, ami azért lép fel, mert a mozgó töltés által létrehozott gerjesztések nem „pillanatszerűen” követik a mozgó töltést, hanem időben kicsit lemaradnak a töltéshez képest. Ez az új erő felelős azért, hogy a mozgó töltött részecskék energiája csökken, amikor felületek előtt mozog. A hallgató feladata ezen fékező erő elméleti tanulmányozása lesz. Számításait klasszikusan és/vagy kvantummechanikai módszerek segítségével fogja elvégezni.

3. Egyszerű és többrétegű mintákban lejátszódó transzport folyamatok vizsgálata (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, informatikus-fizikus , TDK)

A hallgató, különböző (egyszerű valamint több rétegből álló) minták esetében, kísérleti és/vagy részletes Monte Carlo számításokat fog végezni az elektronok rugalmas (rugalmatlanul) visszaszórt elektronspektrumainak vizsgálatára. Feladata lesz a többszörös elektronszórás spektrumtorzító hatásának elemzése.

4. Felületi effektusok vizsgálata (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, informatikus-fizikus, TDK)

A hallgató feladata szilárd mintáról visszaszórt elektronok energiaveszteségi spektrumainak kísérleti meghatározása és/vagy elméleti leírása lesz. A spektrumok analízise segítségével meghatározza a mintára jellemző effektív energiavesztési függvényeket.

5. Többszörös szórások atomi ütközésekben (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, informatikus-fizikus, TDK)

A hallgató ion-atom ütközések klasszikus szimulációjával foglalkozna. Lassú ionok atomokkal történő ütközésekor elektronok úgy is szabaddá válhatnak az ütközés során, hogy az elektron „ide-oda pattog” a lövedék és a célatom magja

Témavezető neve

Téma címe

között, azaz mintha a labda szerepét töltené be egy mikroszkopikus ping-pong játzmában. A hallgató ezeket az érdekes, de kis valószínűséggel előforduló eseményeket vizsgálná.

6. Lézer-atom, lézer-molekula kölcsönhatások elméleti vizsgálata (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, informatikus-fizikus , TDK)

Napjaink fizikájának az egyik legdinamikusabban fejlődő ága a nagy intenzitású igen rövid (akár atto-másodperces) elektromos hullámok által generált folyamatok vizsgálata. A hallgató feladata klasszikus vagy kvantummechanikai alapokon nyugvó program fejlesztése lesz, mellyel atomok vagy molekulák gerjesztését és ionizációját vizsgálná.

7. Mikroelem nyomok csontokban (biológus, biológia szakos tanár BSc, MSc, TDK)

Az MTA Atommagkutató Intézetében számos kísérleti módszer áll rendelkezésre elemi összetétel meghatározására. A hallgató egy ATOMKI-DOTE együttműködés keretében csontok elemi összetételét fogja vizsgálni. Bekapcsolódna a minta előállítás valamint a különböző kísérleti technikák alkalmazásában. Aktív szerepvállalásra számítunk továbbá a kiértékelési munkákba is.

8. Fúziós kutatásokhoz kapcsolódó atom- és felületfizikai adatok elemzése (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, informatikus-fizikus , TDK)

Dél Franciaországban (Cadache) nemzetközi együttműködésben épül az ITER fúziós reaktor. A teljes működésének szimulációjához számos adatbázisra van szükség. A hallgató feladata egyrészt az szakirányú irodalomban található adatok megkeresése, rendszerezése és a szimulációs program meglévő adatbázisához igazítása lesz.

9. Anyagutánpótlás fizikai folyamatai fúziós plazmákban (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, informatikus-fizikus, TDK)

Fúziós plazmák anyagutánpótlása kis hidrogén jég darabokkal, ún. pelletekkel történik. A pellet plazma kölcsönhatás eredményeként a pellet körül kialakul egy sűrű felhő, amely nagymértékben leárnyékolja a pelletet a háttérplazma részecskéitől. A hallgató feladata ez árnyékolás mértékének meghatározása Monte Carlo program segítségével.

10. Töltött részecskék élettani hatása sejtekre és sejtalkotókra (biomérnök, biológus, fizikus)

Az utóbbi években jelentősen megnőtt az érdeklődés a töltött részecskék élő sejtekre kifejtett hatásainak vizsgálata iránt. Korábbi kutatások elsősorban igen nagy energiájú részecskékre vonatkoztak és a gyakorlati sugárterápia megvalósítását tűzték ki célul. Ezeknek a kutatásoknak és kezeléseknél elengedhetetlen feltétele egy igen drága részecskegyorsító. Másrészről a nagyenergiás részecskék az élő szervezetben a célsejtek környezetét is jelentősen károsíthatják.

Jelen kutatómunka tárgya kisenergiás töltött részecskék élő sejtekre kifejtett hatásainak vizsgálata lesz. A töltött részecskéket egy kúposan kialakított szigetelő csövecské segítségével fogjuk eljuttatni a besugározandó sejthez, vagy annak egy alkotójához.

Dr. Tőkési Károly- Dr. Ódor Géza (KFKI MFA)

Felületi mintázatképződés GPU-szimulációs vizsgálata (fizikus, fizika BSc, fizikus MSc, informatikus-fizikus , TDK)